

Załącznik do pisma GIWz-403-381/2014 r. z dnia ... lipca 2014 r.

Wstępne mycie i dezynfekcja

mycie → zawsze przed właściwą dezynfekcją!!!

W kolejności - usunięcie wszelkich zanieczyszczeń organicznych - woda + mydło/detergent
→ płukanie

Ostateczne mycie i dezynfekcja

- nawóz i ściółka: w pryzmie → spryskać środkiem dezynfekcyjnym, pozostawić 42dni/spalić/zakopać
- powierzchnie tłuste lub brudne → odłuszczyć + umyć wodą
- dezynfekcja
- powtórzyć po 7 dniach (odłuszczyć + umyć + zdezynfekować)

Zasady dezynfekcji w przypadku ASF

- właściwy produkt/stężenie/rozcieńczenie
- większa aktywność z detergentami (< 15ml/5l roztworu)
- pozostawić na powierzchni 24 h

| Dezynfekowany obiekt | Dezynfektant | Postępowanie (rozcieńczenie końcowe) |
|-----------------------------------|--|--|
| pomieszczenia dla zwierząt/sprzęt | środki na bazie tlenu: a. Podchloryn sodu b. podchloryn wapnia c. Mononadsiarczan (VI) potasu | 10-30 min. 1:5 (2-3%) 30g/l (2-3%) 20g/l (2%) |
| ścieki, nawóz | spalić lub zakopać Zasady: a. wodorotlenek sodu (soda kaustyczna) b. bezwodny węgiel sodowy i uwodniony Kwasy: a. kwas solny b. kwas cytrynowy | nie stosować na aluminium i stopy metali 20g/l (2%) 40g/l (4%) 1:50 (2%) → 10 min. 2g/l (0,2%) |
| urządzenia elektryczne | pary formaldehydu | |
| pasza | spalić lub zakopać | |
| środowisko | insektycydy (na kleszcze) - środki fosforoorganiczne - syntetyczne pyretroidy | |



Główny Inspektorat Weterynarii ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
tel.: (22) 623-20-88, fax.: (22) 623-14-08, e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, www.wetgiw.gov.pl

| | | |
|-------------------------|--|--|
| ludzie | mydło, detergenty kwas cytrynowy | 2g/l (0,2%) |
| domy | mydło, detergenty środki na bazie tlenu: a. Podchloryn sodu b. podchloryn wapnia c. Mononadsiarczan (VI) potasu | 10-30 min. 1:5 (2-3%) 30g/l (2-3%) 20g/l (2%) |
| maszyny i pojazdy | mydło, detergenty Zasady: a. wodorotlenek sodu (soda kaustyczna) b. bezwodny węglan sodowy i uwodniony | nie stosować na aluminium i stopy metali 20g/l (2%) 40g/l (4%) |
| odzież | mydło, detergenty Zasady: a. wodorotlenek sodu (soda kaustyczna) b. bezwodny węglan sodowy i uwodniony | |
| budynki inwentarskie | Tosylochloramid Na | Preparat nanosi się na dezynfekowaną powierzchnię lub ściółkę 1-2 x w tygodniu przez równomierne posypanie w ilości 50-100 g/ 1 m ² |

